

Dyrkningsvejledning

Tips til succesfuld dyrkning af græsfoderurter



En græsmark, der er rig på urter, kræver en anden tilgang i forhold til anlægning og vedligeholdelse end en ren græsmark. Den nødvendige forvaltning varierer desuden afhængigt af jordtypen. Med nedenstående tips er du sikret en vellykket dyrkning af græs med foderurter. Med dit valg af gødskning kan du styre forholdet i den botaniske sammensætning.

FORBEREDELSE

Ren grund	Vælg en grund med lavt ukrudtstryk eller brug et falskt såbed.
pH	Få pH'en på plads (sand > 5,5; ler > 6,0).
Gødskning	Arealet skal ikke gødes inden udsåningen. Det forebygger at urterne møder stærk konkurrence fra græsset under etablering og tidlig vækst.
Såbed	Forbered et plant og fast såbed.

UDSÅNING

Såperiode	April eller fra midt august til midt september.
Såhastighed	NutriHerb rørsvingel 60 kg pr. ha NutriHerb Engels rajgræs 45 kg pr. ha NutriHerb oversåning 15 kg pr. ha
Tilføj ekstra kløver	Vil du gøde afgrøden minimalt eller har du dårlig sandjord, så kan du vælge at tilføje ekstra kløver til NutriHerb. Du får det bedste resultat med 3 kilo Quartet-hvidkløver.
Blanding	Bland regelmæssigt frøene under såningen for at forekomme adskillelse (mindst for hver hektar).
Sådybde	0,5 - 1 cm. Brug en Cambridge-rulle til at presse frøet korrekt ned i jordbunden.
Kørefastand	Maks. 8 cm.
Eftersåning	Omlægning er at foretrække frem for eftersåning. NutriHerb oversåning er specielt sammensat til at tilføje urter til eksisterende græsarealer.



GØDSKNING

Gødskning

- Du kan påvirke forholdet mellem urter og græs med din gødskning.
- 30 m³ kvæggylle pr. ha om foråret.
 - 15 m³ kvæggylle pr. ha efter 2. slæt.
 - Dosis af kvælstofgødning alt afhængt af brugsintensiteten af urtegrunden.
 - Fosfat- og kaliumgødning alt afhængigt af jordbundstilstand og udvinding.

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse

- Lad ikke afgrøden blive for gammel på grund af overvækst, smag og næringsværdi.
- Skiftende græsslåning og græsning giver de bedste resultater.
 - Ukrudtsbekæmpelse er ikke mulig.

HØST

Enge

- Regelmæssig rotationsgræsning stimulerer kløverarternes genvækst.
- Lad ikke afgrøden overvokse.

Tørstofprocent

Højest 45 % ds i forbindelse med smuldringstab, undgå helst at ryste.

Klippehøjde

Min. 6 cm.

Ensilering

Tilsæt Bonsilage for at opnå en bedre konservering samt forebygge varmedannelse og mug.

 **BARENBRUG**

Make Life Beautiful